

รายงาน การเฝ้าระวังโรคประจำสัปดาห์ WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE REPORT

DIVISION OF EPIDEMIOLOGY MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

สารบัญ	ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) พ.ศ. 2536	309
contents	ครุฑนัรายนการเฝ้าระวังโรคประจำสัปดาห์ Volume 25 Number 1-25	318

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

พ.ศ. 2536

ในปี พ.ศ. 2536 กองระบาดวิทยา ได้รับรายงานโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งสิ้น 54,478 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 93.4 ต่อประชากรแสนคน เพิ่มขึ้นจากปี 2535 (รูปที่ 1) ผู้ป่วยเป็นเพศชาย 26,494 ราย เพศหญิง 27,984 ราย อัตราส่วนระหว่างเพศหญิงต่อเพศชายเท่ากับ 1.06 ต่อ 1 มีผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.005 อัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป รองลงมาได้แก่ กลุ่มอายุ 25-34 ปี และ 15-24 ปี ตามลำดับ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับในปี 2535 (รูปที่ 2) อาชีพที่พบบ่อยคือ เกษตรกร และรับจ้าง

มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม-สิงหาคม) และต่อเนื่องไปจนถึงต้นฤดูหนาว (ตุลาคม-พฤศจิกายน) (รูปที่ 3) ลักษณะการกระจายของผู้ป่วยเป็นรายเดือน คล้ายคลึงกับปีก่อน ๆ

การเกิดโรคในแต่ละภาค พบว่า ภาคใต้มีอัตราป่วยสูงสุด เท่ากับ 180.9 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง มีอัตราเท่ากับ 85.2, 80.9 และ 75.3 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ (รูปที่ 4)

จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด เท่ากับ 484.7 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงรองลงมา ได้แก่ จังหวัดตรัง ภูเก็ต เลย และนครปฐม มีอัตราป่วยเท่ากับ 413.1, 363.1, 328.4 และ 321.1 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ (รูปที่ 5)




Fig. 1 Reported Cases of Influenza Per 100,000 Population, by Year, Thailand, 1984-1993.




Fig. 2 Reported Cases of Influenza Per 100,000 Population, by Age-Group, Thailand, 1989-1993.




Fig.3 Reported Cases of Influenza by Month, Thailand, 1989-1993.

