

การเจ็บป่วยที่ไม่ทราบสาเหตุในนิการากัว/ฮอนดูรัส

(Unidentified illness in Nicaragua /Honduras)

1 พฤศจิกายน 1995 Health authorities ในนิการากัว ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อค้นหาสาเหตุของการเจ็บป่วยที่ไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งทำให้มีผู้ป่วยนับร้อยคน ในพื้นที่ Achuapa และมีผู้เสียชีวิต 15 คน

คณะกรรมการประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขจาก WHO regional Office for the Americas/Pan American Health Organization (AMRO/PAHO) ที่ทำงานในนิการากัวอยู่แล้ว นักระบาดวิทยาและนักกีฏวิทยาจาก CDC ของสหรัฐอเมริกาและนักวิทยาศาสตร์จากคิวบา คณะทำงานนี้ได้ดำเนินการสอบสวนและหาสาเหตุของโรคดังกล่าว ซึ่งมีอาการตั้งแต่ไข้สูง จนถึงมีเลือดออกภายใน

การทดสอบที่ห้องปฏิบัติการของ CDC ที่ Fort Collin รัฐ Colorado ให้ผลลบ (-) สำหรับโรค Dengue ซึ่งเป็นการยืนยันผลการทดสอบเบื้องต้นที่ทำใน Achuapa ห้องปฏิบัติการ CDC กำลังทดสอบตัวอย่างน้ำเหลือง เพื่อหาไวรัสที่นำโดยเห็บและ ยุง ที่ทำให้เกิดไข้เลือดออก

AMRO/PAHO ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา ไปทำงานพร้อมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของนิการากัว หลังจากได้รับรายงานผู้ป่วยจากเมือง Leon ผู้ป่วยรายแรก ๆ ได้รับรายงานเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ใน Achuapa ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวง Managua ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 100 กิโลเมตร

คณะผู้เชี่ยวชาญกำลังกำหนดนิยามผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าว ขณะเดียวกันมีรายงานผู้ป่วยลักษณะคล้ายกันนี้ที่ยังไม่ได้รับ สำหรับการยืนยันใน Honduras

เรียบเรียงจาก

Unidentified illness in Nicaragua /Honduras ใน WER No.44, 1995, p 316

โดย นางสาวลินจง บ่อหิรัญรัตน์ นักวิชาการสุขาภิบาล 7 (Miss. linchong Bouhuranrat)
ฝ่ายสุขาภิบาลควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค
กองสุขาภิบาล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ตรวจพบ Leptospirosis ในนิการากัว

(Leptospirosis Identified in Nicaragua)

6 พฤศจิกายน 1995 จากการทดสอบเบื้องต้น โดย CDC สหรัฐอเมริกา พบว่า สาเหตุของโรคที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 16 ราย ในนิการากัว คือ Leptospirosis ชนิดที่ไม่เคยพบมาก่อน

ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขจาก CDC, AMRO/PAHO ได้ค้นหาการระบาดของโรคนี้ที่เกิดขึ้นในกลางเดือนตุลาคม ซึ่งมีผู้ป่วยประมาณ 1,850 คน ในรายงานเบื้องต้นแจ้งว่าเป็นโรคไข้เลือดออก ซึ่งพบตามปกติในย่านนี้ ต่อมาพบว่าไม่ใช่ไข้เลือดออก หลังจากที่ได้ผ่าศพตรวจ พบเลือดออกมากทางระบบหายใจ และผลการชันสูตรให้ผลลบ ผลการชันสูตร 3 ใน 4 ตัวอย่าง ให้ผลบวกต่อ Leptospirosis

Leptospirosis พบบ่อยในอเมริกาและเอเชีย ปกติมีผลต้อตบหรือไต มากกว่าระบบทางเดินหายใจ มักจะติดเชื้อจากปัสสาวะ ผ่านทางบาดแผลของผิวหนัง ไม่ค่อยพบวิธีถ่ายทอดโรคจากคนไปสู่คน อาการที่พบ มีไข้