

รายงาน การเฝ้าระวังโรค ประจำสัปดาห์

VOLUME 14 NUMBER 7
FEBRUARY 25, 1983

สถานการณ์โรคหวัดตกโรค 73
Lab surveillance 83
รายงานโรคติดต่อจาก WER 83

EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE REPORT

สถานการณ์โรค

สถานการณ์โรคหวัดตกโรค ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ ได้รับรายงานผู้ป่วย ๕๐ ราย ไม่มีตายจาก ๘ จังหวัด คือ

- สงขลา ๒๐ ราย ที่ อ.เมือง ๑๗ ราย รัตภูมิ ๒ ราย สทิงพระ ๑ ราย
- สมุทรปราการ ๔ ราย ที่ อ.เมือง ๕ ราย พระประแดง ๔ ราย
- กรุงเทพมหานคร ๕ ราย ที่เขตราชบุรีบูรณะ ๒ ราย ยานนาวา มินบุรีและบางเขน เขตละ ๑ ราย
- นนทบุรี ๕ ราย ที่อำเภอเมือง ๒ ราย บางกรวย ไทรน้อย ปากเกร็ด อำเภอละ ๑ ราย
- สุราษฎร์ธานี ๔ ราย ที่อำเภอเมือง ๒ ราย ดอนสัก และ พุนพิน อำเภอละ ๑ ราย
- ระยอง ๔ ราย ที่อำเภอเมืองทั้ง ๔ ราย
- สมุทรสงคราม ๒ ราย ที่อ.อัมพวา
- สระบุรี ๑ ราย ที่ อ.แก่งคอย

ผู้ป่วยที่ได้รับรายงานใหม่ในสัปดาห์นี้เป็นผู้ป่วยที่มีวันเริ่มป่วยระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๓๖ ราย วันที่ ๖ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๑๓ ราย และ ๓๐ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๑ ราย

สำหรับจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการระบาดมากที่สุดในปีนี้ รวมผู้ป่วยตั้งแต่ต้นปีจนถึงสัปดาห์นี้ป่วย ๕๖ ราย ตาย ๓ ราย เป็นผู้ป่วยในเขตท้องที่อำเภอเมือง ๔๓ ราย ตาย ๒ ราย สทิงพระ ๕ ราย ตาย ๑ ราย หาดใหญ่ ๓ ราย จะนะ ๒ ราย รัตภูมิ ๒ ราย และเทพา ๑ ราย

อหิวาตกโรค - เดือนมกราคม

มีรายงานการสอบสวนโรคอหิวาต์รวม ๗ รายจาก ๓ จังหวัด คือพระนครศรีอยุธยา (๒ ราย) สมุทรสงคราม(๑ ราย) และนครศรีธรรมราช(๔ ราย)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ทำการสอบสวนโรคผู้ป่วยรายแรกและรายที่สอง หลังจากวันเริ่มป่วย ๑๒ และ ๔ วันตามลำดับ เก็บอุจจาระผู้สัมผัสในบ้านผู้ป่วยรายแรก ๘ และ ๑๓ คน และบ้านผู้ป่วยรายที่ ๒ ทั้งหมด ๘ คน น้ำบ่อน้ำบ้านและน้ำคลองส่งตรวจ ผลการตรวจไม่พบ V.cholerae ทั้งจากอุจจาระและน้ำ

จ.สมุทรสงคราม ได้ออกสอบสวนโรคผู้ป่วยซึ่งเป็นเด็กชาย อายุ ๑ เดือน ๗ วัน ไม่พบแหล่งของการแพร่เชื้อ การทำ rectal swab ผู้ป่วยตั้งแต่วันที่สองของการป่วยติดต่อกันรวม ๔ วัน พบ V.cholerae ในสองวันแรก สองวันหลังไม่พบ V.cholerae แล้ว แม้ผู้ป่วยจะยังมีการอุจจาระร่วงอยู่ การตรวจอุจจาระผู้สัมผัสในบ้านรวม ๖ ราย และเก็บน้ำดื่ม น้ำใช้ น้ำคลองส่งตรวจ ไม่พบ V.cholerae เช่นกัน แต่พบ V.parahaemolyticus ในผู้สัมผัส ๒ ราย (๓๓.๓%)

อหิวาตกโรค ตั้งแต่ต้นปีนี้ปรากฏว่า มีรายงานผู้ป่วยอหิวาตกโรคเพิ่มขึ้น เป็นแนวโน้มที่น่าสนใจ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ ๖ (สิ้นสุด ๑๒ ก.พ.๒๖) ซึ่งมีผู้ป่วยทั้งหมด ๒๔ ราย เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อน ๆ ซึ่งมีรายงานประมาณสัปดาห์ละ ๑๑ - ๑๗ ราย และมีผู้ป่วยรวมตั้งแต่ต้นปี ๑๑๔ ราย ตาย ๖ ราย เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว ๗ สัปดาห์แรกไม่มีรายงานผู้ป่วยเลย แสดงว่าแนวโน้มสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ภาคใต้คือสงขลา มีผู้ป่วยรวม ๕๐ ราย ตาย ๓ ราย นครศรีธรรมราช ป่วย ๖ ราย ตาย ๑ ราย สุราษฎร์ธานีป่วย ๕ ราย ยะลา ป่วย ๑ ราย สิ่งที่น่าสังเกตคือมีผู้ป่วยเป็นหย่อม ๆ มากกว่าที่อื่น เช่นในอำเภอเมืองสงขลา นอกจากนั้นยัง พบ พาหะของอหิวาตกโรคในอัตราค่อนข้างสูง คือประมาณร้อยละ ๑๐ ส่วนด้านการรักษาก็พบมีอัตราตายค่อนข้างสูง แม้แต่อายุ ๓๐ ปีก็ยังสามารถตายหลังรักษาแล้วถึง ๖ วัน ดังนั้นจึงน่าสงสัยว่าความรุนแรงของอหิวาตกโรคของปีนี้อาจจะมากกว่าปีที่แล้ว และอาจจะลุกลามไปในท้องที่กว้างขวางขึ้น จึงสมควรจะต้องเร่งรัดการเฝ้าระวังโรคอย่างกวดขัน รวมทั้งซักซ้อมการรักษาและควบคุมโรคให้ได้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น