

รายงาน การเฝ้าระวังโรค ประจำสัปดาห์

VOLUME 14 NUMBER 12

APRIL 1, 1983

สถานการณ์โรค	133
การระบาดของภาวะขาดอาหาร	
นครราชสีมา	134
รายงานโรคติดต่ออันตราย	144

EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE REPORT

สถานการณ์โรค

สถานการณ์อหิวาตกโรค สัปดาห์ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๖ ได้รับรายงานผู้ป่วย ๔๕ ราย ตาย ๓ ราย จาก ๑๔ จังหวัด เป็นผู้ป่วยที่มีวันเริ่มป่วยระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ มีนาคม ๕๕ ราย ตาย ๓ ราย วันที่ ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๔ ราย และวันที่ ๖ - ๑๒ มีนาคม ๒ ราย จังหวัดที่รายงานผู้ป่วยใหม่ในสัปดาห์นี้ คือ

- กรุงเทพมหานคร ๑๒ ราย ตาย ๑ ราย ที่เขตพระโขนง เขตป้อมปราบ เขตละ ๒ ราย เขตบางเขน ๒ ราย ตาย ๑ ราย ที่ถึงแก่กรรมเป็นเด็กหญิงอายุ ๓ ปี ตายที่ O.P.D. ของโรงพยาบาลบำราศนราดูร นอกจากนี้ที่เขตดุสิต เขตยานนาวา เขตห้วยขวาง เขตบางกอกน้อย เขตภาษีเจริญ และเขตราชบุรี ๑ ราย

- สมุทรปราการ ๑๔ ราย ที่อำเภอเมือง ๔ ราย อำเภอพระประแดง ๔ ราย และอำเภอบางพลี ๑ ราย

- สุราษฎร์ธานี ๑๔ ราย ที่อำเภอเมือง ๔ ราย อำเภอบ้านนาสาร ๒ ราย อำเภอพนม อำเภอพุน อำเภอบ้านตาขุน และอำเภอท่าฉาง อำเภอละ ๑ ราย

- นนทบุรี ๑๐ ราย ที่อำเภอเมือง ๕ ราย อำเภอปากเกร็ด ๒ ราย อำเภอไทรน้อย ๒ ราย และอำเภอบางกรวย ๑ ราย

- สมุทรสงคราม ๔ ราย ที่อำเภอเมือง ๕ ราย อำเภออัมพวา ๒ ราย และอำเภอบางคนที ๑ ราย

- ปัตตานี ๗ ราย ที่อำเภอเมือง ๔ ราย อำเภอยะหริ่ง ๒ ราย และอำเภอสายบุรี ๑ ราย

- นครราชสีมา ๕ ราย ตาย ๑ ราย ที่อำเภอเมือง ๓ ราย ตาย ๑ ราย รายที่ตายเป็นหญิงอายุ ๗๔ ปี ตายที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่อำเภอพิมาย และอำเภอจักราช อำเภอละ ๑ ราย

- นครศรีธรรมราช ๔ ราย ที่อำเภอเมือง ๓ ราย และอำเภอพิปูน ๑ ราย
- ปทุมธานี ๓ ราย ที่อำเภอสามโคก ๒ ราย และอำเภอลำลูกกา ๑ ราย
- สมุทรสาคร ๒ ราย ที่อำเภอบ้านแพ้วทั้ง ๒ ราย
- เพชรบุรี ๒ ราย ที่อำเภอบ้านแหลมทั้ง ๒ ราย
- อุดรธานี ๒ ราย ที่อำเภอลาดบัวหลวง และอำเภอผักไห่ อำเภอละ ๑ ราย
- ชลบุรี ๑ ราย และถึงแก่กรรมที่กิ่งอำเภอเกาะสีชัง รายนี้ยังไม่ทันได้รับการรักษา
เป็นเด็กหญิงอายุ ๑ ปี ตายที่บ้านผู้ป่วย
- ร้อยเอ็ด ๑ ราย ที่อำเภอธวัชบุรี

รวมผู้ป่วยตั้งแต่ต้นปีทั่วประเทศป่วย ๔๒๒ ราย ตาย ๑๒ ราย

การระบาดของภาวะขาดอาหาร, จังหวัดนครราชสีมา

ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๒๕ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๒๔-กันยายน ๒๕๒๕ ศูนย์
โภชนาการเขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ได้ดำเนินการสำรวจและแผ้วระวังติดตามภาวะโภชนาการของทารกและเด็กในวัยก่อน
เรียน (๐-๑๑ เดือนและ ๑๒-๕๔ เดือน) ในจังหวัดนครราชสีมา รวม ๒๕,๓๔๔ คนใน
๔๒๔ หมู่บ้าน (๑๗ % ของหมู่บ้านทั้งหมดในจังหวัด) ซึ่งแยกเป็นเด็กในหมู่บ้านพื้นที่ปกติ
รวม ๔๖๐๑ คน (๑๕๐ หมู่) และเด็กในหมู่บ้านพื้นที่ยากจนรวม ๑๔๓๔๔ คน (๒๕๗ หมู่,
๗๑.๖ % ของหมู่บ้านพื้นที่ยากจนทั้งหมด) ที่เหลืออีก ๑๓๔๔ คนมาจาก ๑๗ หมู่บ้านซึ่งอยู่
ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลอำเภอ ๑๓ แห่ง (ตารางที่ ๑)

การสำรวจพบว่าเด็กทารกมีภาวะขาดอาหาร (รวมทุกระดับ) น้อยกว่าเด็กในวัย
ก่อนเรียนในทุกพื้นที่ (๒๖.๓-๓๔ % ในเด็กทารก, ๔๓.๓-๖๑.๖ % ในเด็กในวัยก่อนเรียน,
 $P < 0.05$ ทุกพื้นที่) ขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบเด็กทารกในหมู่บ้านพื้นที่ปกติกับ
ทารกในหมู่บ้านพื้นที่ยากจนและเด็กในวัยก่อนเรียนในทั้ง ๒ พื้นที่พบว่าเด็กทารกและเด็ก
ในวัยก่อนเรียนในพื้นที่ปกติจะมีภาวะขาดอาหารน้อยกว่าเด็กทารกหรือเด็กในวัยก่อนเรียน
ในพื้นที่ยากจนเช่นกัน (๒๖.๓ และ ๓๗ % สำหรับเด็กทารก $P < 0.05$ และ $\hat{RR}$ ๑.๖
๔๓.๓ และ ๕๔.๖ % สำหรับเด็กในวัยก่อนเรียนใน ๒ พื้นที่ดังกล่าว, $P < 0.05$ และ

RR ~ ๑.๕) โดยเด็กทารกและเด็กในวัยก่อนเรียนในพื้นที่ยากจนมีโอกาสที่จะเกิดภาวะ

ขาดอาหารสูงกว่า ๑.๖ และ ๑.๕ เท่าตามลำดับ

ตารางที่ ๑ การสำรวจและเฝ้าระวังติดตามภาวะโภชนาการของทารกและเด็กในวัย

ก่อนเรียน ๔๒๔ หมู่บ้าน จังหวัดนครราชสีมา, ตุลาคม ๒๕๒๔-กันยายน ๒๕๒๕

ภาวะโภชนาการ (%)

	อายุ	ปกติ	๑	๒	๓	รวม
พื้นที่ปกติ	๑	๑๔๔๗ (๗๓.๗)	๔๑๘ (๒๑.๓)	๘๕ (๔.๓)	๑๓ (๐.๗)	๑๙๖๔
(๑๕๐ หมู่)	๑-๔	๔๓๒๙ (๕๖.๗)	๒๔๘๓ (๓๒.๕)	๗๓๘ (๙.๗)	๘๗ (๑.๑)	๗๖๓๗
พื้นที่ยากจน	๑	๑๒๘๖ (๖๐.๙)	๕๗๑ (๒๗.๐)	๒๑๗ (๑๐.๓)	๓๘ (๑.๘)	๒๑๑๒
(๑๗๒ หมู่)	๑-๔	๓๓๒๙ (๔๑.๒)	๓๓๓๕ (๔๑.๓)	๑๓๑๕ (๑๖.๓)	๑๐๕ (๑.๓)	๘๐๘๔
พื้นที่ยากจน ในโครงการฯ	๑	๕๙๒ (๖๘.๑)	๒๑๑ (๒๔.๓)	๕๘ (๖.๗)	๘ (๐.๙)	๘๖๙
(๘๕ หมู่)	๑-๔	๑๒๗๑ (๓๘.๔)	๑๕๒๔ (๔๖.๓)	๕๖๔ (๑๔.๑)	๓๔ (๑.๐)	๓๒๙๓
รพอ.ภูแล	๑	๑๙๘ (๖๗.๘)	๗๙ (๒๗.๐)	๑๒ (๔.๑)	๓ (๑.๐)	๒๙๒
(๑๓ หมู่)	๑-๔	๔๗๙ (๔๓.๘)	๔๔๕ (๔๐.๗)	๑๖๐ (๑๔.๖)	๙ (๐.๘)	๑๐๙๓
					รวม	๒๕๓๔๔

แม้ภาวะขาดอาหารจะกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา แต่จะ

เห็นว่าในพื้นที่ยากจนและในเด็กในวัยก่อนเรียน (๑๒-๕๙ เดือน) มีความรุนแรงของปัญหาที่สูงกว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกองโภชนาการ กรมอนามัย ได้เริ่มดำเนินโครงการโภชนาการในพื้นที่และกลุ่มเด็กที่เป็น high risk group ดังกล่าวเพื่อปรับปรุงภาวะโภชนาการของเด็กทารกและเด็กในวัยก่อนเรียน โดยเริ่มใน ๔๕ หมู่บ้านของพื้นที่ยากจนในปี ๒๕๒๕ ก่อนและจะขยายออกไปในปีต่อ ๆ ไป

ผู้รายงาน ศูนย์โภชนาการเขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ - ภาวะโภชนาการ ๑, ๒ และ ๓ หมายถึงภาวะขาดอาหารระดับที่ ๑, ๒ และ ๓