

ISSN 0125 - 7447

รายงาน การเฝ้าระวังโรค ประจำสัปดาห์

VOLUME 14 NUMBER 50
DECEMBER 23, 1983

สถานการณ์โรคหวัดตกโรค 640
แผนการรักษาการเฝ้าระวังโรคและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 640
รายงานโรคติดต่ออันตราย 651

EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE REPORT

สถานการณ์โรคหวัดตกโรค สัปดาห์ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๖ ได้รับรายงาน
ผู้ป่วยเพียง ๑ ราย ไม่มีตาย จากจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้ป่วยจากอำเภอขลุง ที่บ้านหมู่ที่ ๔
ตำบลตะปอน เริ่มป่วย ๑๓ ธันวาคม เข้ารับการรักษา ๑๔ ธันวาคม ที่โรงพยาบาลแหลมสิงห์
ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายล่าสุด ทำให้ผู้ป่วยรวมตั้งแต่ต้นปีทั่วประเทศป่วย ๑๔๙๖ ราย ตาย ๔๑ ราย

แผนการรักษาการเฝ้าระวังโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (พ.ศ. ๒๕๒๖)

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

CONDYLOMATA ACUMINATA (GENITAL WARTS)

ถ้า WARTS เนื้ออ่อนนุ่ม และมีขนาดเล็กหรือปานกลาง ให้ทาผิวหนัง
หรือเยื่อที่อยู่รอบ ๆ ด้วยวาสลินเสียก่อน แล้วจึงใช้ยาทาต่อไป
ยาที่ใช้รักษา

๑. TRICHLORACETIC ACID (SATURATED SOLUTION)

- ใช้จี้ WARTS

PODOPHYLLIN (25 % in Tr. BENZOIN COMPOUND)

๒. - ใช้จี้ WARTS

ถ้ายังไม่หายต้องใช้ยาจี้ซ้ำทุก ๒-๓ วัน จนกว่าจะหาย

ถ้า WARTS เล็กและแข็งให้ใช้ ETHYLCHLORIDE พ่นให้ชา

แล้วใช้ VOLK MANN' S SPOON ขูดออกแล้วใช้ SILVER NITRATE STICK

หรือ crystal จี้ที่บริเวณที่มีเลือดออกโดยทั่วไปแล้ว ครั้งเดียวก็เพียงพอ

ถ้า WARTS มีขนาดใหญ่ต้องใช้ GENERAL ANESTHESIA
แล้วใช้เครื่องจี้ไฟฟ้าตัดออก (ELECTRIC CAUTERIZER)

ถ้า WARTS อยู่ในท่อน้ำปัสสาวะ ผู้ป่วยชายอาจใช้วิธี ELECTRIC
CAUTERIZER โดยใช้ LOCAL ANESTHESIA

SCABIASIS

ยาที่ใช้รักษา

๑. BENZYL BENZOATE 25 % (EMULSION)

- ใช้ทาทั่วตัว (ยกเว้นใบหน้า) ตั้งแต่คอลงมาจนถึงปลายเท้า ปล่อยให้
ทิ้งไว้ให้ยาแห้ง และต้องแนะนำไม่ให้ผู้ป่วยอาบน้ำหรือล้างมือหลังจากทายาแล้ว ควรให้
ผู้ป่วยทายาเช่นนี้อีกครึ่งหนึ่งในวันรุ่งขึ้น และเมื่อครบ ๒๔ ชั่วโมง หลังจากทายาครั้งสุดท้าย
อนุญาตให้ผู้ป่วยอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าชั้นในได้ ยานี้ไม่ควรใช้กับเด็ก

๒. GAMMA BENZENE HEXACHLORIDE 1 % (CREAM)

- ใช้ยา GAMMA BENZENE HEXACHLORIDE 1 % ชนิดครีมทาแทน
BENZYL BENZOATE ก็ได้ผลดีเช่นกันเหมาะสำหรับเด็ก

PEDICULOSIS PUBIS

ยาที่ใช้รักษา

GAMMA BENZENE HEXACHLORIDE 1 % (CREAM)

- ใช้ยาชนิด CREAM ทา โดยปกติแล้วการปฏิบัติเช่นนี้ครั้งเดียวก็
ได้ผล แต่ถ้ามีตัวโตนมาก อาจทำซ้ำอีกครั้งหนึ่ง หลังจากทำครั้งแรกแล้ว ๓ วัน หรืออาจ
ต้องทำเป็นครั้งที่ ๓ ก็ได้

HERPES GENITALIS

โรคนี้ไม่มีการรักษาเฉพาะเจาะจง เนื่องจากโรคหายได้เอง
การรักษาสุขภาพของร่างกาย (SIMPLE HYGIENE METHOD) จะช่วยในการป้องกัน
และรักษาโรคนี้ได้

ยาที่ใช้รักษา

๑. ถ้าไม่มีอาการอักเสบแทรกซ้อน ให้ปฏิบัติดังนี้คือ.-

ก. ใช้น้ำเกลือ ๐.๙ % (NORMAL SALINE) ล้างแผลให้สะอาด
ก็เป็นการเพียงพอในการรักษาโรค

ข. หลังจากล้างแผลด้วยน้ำเกลือแล้ว อาจใช้ ETHER หรือ CHLOROFORM
จี้แผลจะช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น

๒. ถ้ามีอาการอักเสบแทรกซ้อน ให้ใช้ยาประเภท SULPHONAMIDES
ยาประเภทนี้ไม่ขัดขวางการฟิเคอเรทโรคซิฟิลิส

SULPHADIMIDINE

- ๑.๕ กรัม วันละ ๔ เวลา รวมทั้งสิ้น วันละ ๖ กรัม จนกว่าจะหาย
แต่ไม่เกิน ๑๐ วัน

TRIMETHOPRIM 80 mg + SULPHAMETHOXAZOL 400 mg
(CO- TRIMOXAZOL)

- กินยารั้งละ ๒ เม็ด ๒ เวลา เข้าและเย็นจนกว่าจะหาย หรือไม่
เกิน ๑๐ วัน ถ้ามีการเจ็บหรือปวดมาก อาจให้ยาแก้ปวดร่วมด้วยก็ได้

แก้คำผิดฉบับที่แล้ว

หน้า 632 เปลี่ยนเป็นหน้า 630

หน้า 633 เปลี่ยนเป็นหน้า 631

หน้า 630 เปลี่ยนเป็นหน้า 632

หน้า 631 เปลี่ยนเป็นหน้า 633