

ISSN - 7447

รายงาน การเฝ้าระวังโรค ประจำสัปดาห์

WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL
SURVEILLANCE REPORT

VOLUME 16 NUMBER 28

JULY 19, 1985


โปลิโอในศูนย์อพยพชาวกัมพูชา- ปราจีนบุรี	33
สรุปการสอบสวนโรคอหิวาต์, เมษายน-มิถุนายน 2528	33
ทริคิโนลิส-เชียงใหม่	34
ผลการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์-กุมภาพันธ์ 2528	34
สถานการณ์โรค	34

การสอบสวนโรค

โปลิโอในศูนย์อพยพชาวกัมพูชา-ปราจีนบุรี

Polio myelitis in a refugee camp-Prachin Buri

รูปที่ 1 ผู้ป่วยโปลิโอในศูนย์อพยพตามเดือน
เริ่มป่วย, กิ่งอำเภอลองทาด
จังหวัดปราจีนบุรี, กุมภาพันธ์ -
เมษายน 2528




ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2528 มีการระบาดของโรคโปลิโอเกิดขึ้น
ในศูนย์อพยพชาวกัมพูชาแห่งหนึ่ง ในตำบลคลองทาด กิ่งอำเภอลองทาด จังหวัดปราจีนบุรี พบ
ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยขั้นต้นว่าเป็นโปลิโอ รวม 16 ราย เป็นชาย 8 ราย หญิง 8 ราย

อายุตั้งแต่ 5 เดือน - 8 ปี ในจำนวนนี้เสียชีวิต 1 ราย เริ่มมีผู้ป่วยรายแรกในกลางเดือน
กุมภาพันธ์ รายต่อมาเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม ผู้ป่วยส่วนใหญ่ป่วยในเดือนมีนาคมและเมษายน
โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนมีนาคมต่อต้นเดือนเมษายน (รูปที่ 1) อาการป่วยประกอบด้วย
กล้ามเนื้อแขนหรือขาอ่อนแรง 15 ราย กล้ามเนื้อคออ่อนแรง 1 ราย รายที่เสียชีวิตมีอัมพาต
ของกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจร่วมด้วย ทั้ง 16 ราย ดังกล่าวมีเพียง 5 ราย ที่มีประวัติได้
รับวัคซีนโปลิโอมาก่อน โดยได้รับ 2 ครั้ง 2 ราย และได้รับเพียง 1 ครั้ง 3 ราย ผลการตรวจ
เลือดจากผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่สถาบันวิจัยไวรัส กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าเป็นการระบาดของ
Poliovirus type 3

ในศูนย์ดังกล่าวมีชาวกำพูชาอพยพประมาณ 70,000 คน เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
12,000 คน สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในศูนย์ที่ได้รับวัคซีนโปลิโอมีประมาณ 7,160 คน
(60 %) แต่ทะเบียนหลักฐานการรับวัคซีนไม่แน่นอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ได้
แจ้งให้โรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่อยู่บริเวณชายแดน เฝ้าระวังการเกิดโรค
โปลิโอในท้องที่ของตนเอง และส่วนในท้องที่ตำบลคลองหาด ให้เร่งรัดการให้ภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน
โปลิโอให้ครอบคลุมเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีให้ครบ 100 % เพื่อป้องกันการเกิดโรคโปลิโอที่อาจแพร่
กระจายไปจากศูนย์อพยพนี้

ผู้รายงาน เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี



สรุปการสอบสวนโรคอหิวาต์ เมษายน-มิถุนายน 2528

Summary of cholera investigations, April-June 1985

จังหวัดที่เกิดโรค	วันเริ่มป่วย	ผู้ป่วย/พาหะ	แหล่งแพร่โรค	มาตรการควบคุม
ราชบุรี	3 กพ.	1/5	ไม่ทราบ	ตรวจอุจจาระผู้สัมผัส ตรวจอาหาร น้ำ tetracycline ให้สุศึกษา
นครราชสีมา	31 มีค.	1/1	ไม่ทราบ	ตรวจอุจจาระผู้สัมผัส ตรวจน้ำ ให้สุศึกษา tetracycline
จันทบุรี	6 เมย.	1/0	ไม่ทราบ	ตรวจอุจจาระผู้สัมผัส ตรวจอาหาร น้ำ tetracycline ให้สุศึกษา
ระยอง	4 มีค.-3 เมย.	77/56	ไม่ทราบ	ตรวจอุจจาระผู้สัมผัส ตรวจอาหาร น้ำ tetracycline ให้สุศึกษา
สุราษฎร์ธานี	15 มีค.-21 เมย.	2/0	ไม่ทราบ	ตรวจอุจจาระผู้สัมผัส ให้สุศึกษา
สมุทรสงคราม	20-27 มีค.	5/0	ไม่ทราบ	ตรวจอุจจาระผู้สัมผัส ตรวจอาหาร น้ำ tetracycline ให้สุศึกษา
	1-23 เมย.	9/0	ไม่ทราบ	ตรวจอุจจาระผู้สัมผัส ตรวจอาหาร น้ำ tetracycline ให้สุศึกษา

จังหวัดที่เกิดโรค วันเริ่มป่วย ผู้ป่วย/พาหะ แหล่งแพร่โรค มาตรการควบคุม

27 เมย.-9 พค.

4/1

ไม่ทราบ

ตรวจอุจจาระผู้สัมผัส

ตรวจอาหาร น้ำ

tetracycline

ให้สุศึกษา

สถานสงเคราะห์หญิง, 19-24 พค.

14/7

ไม่ทราบ

ตรวจอุจจาระผู้สัมผัส

ตรวจอาหาร น้ำ

tetracycline

ให้สุศึกษา

นนทบุรี

ผู้รายงาน เจ้าหน้าที่ระดับวิชา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, ราชบุรี, นครราชสีมา,
จันทบุรี, ระยอง, สุราษฎร์ธานี, สมุทรสงคราม, นนทบุรี, ศูนย์ระดับวิชา
ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี, ศูนย์ระดับวิชาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดนครราชสีมา

ทริคิโนสิส-เชียงใหม่Trichinosis-Chiang Mai

ในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม 2528 ได้เกิดการระบาดของโรคทริคิโนสิสขึ้นในหมู่บ้าน 9 ตำบลแม่ฮาด อำเภอแม่ฮาด จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ป่วยรวม 34 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต เป็นชาย 21 คน หญิง 13 คน อายุตั้งแต่ 3-66 ปี ส่วนใหญ่อายุ 15-34 ปี (48%) เริ่มมีผู้ป่วยรายแรก ๆ ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน อาการไม่มากได้รักษาตนเองตามพื้นบ้าน เริ่มมีผู้ป่วยที่มีอาการมากเข้ารับการรักษารักษาในโรงพยาบาลแม่ฮาดในวันที่ 6 พฤษภาคม ทั้ง 34 ราย พบว่าเข้ารับการรักษารักษาในโรงพยาบาล 7 ราย อีก 27 ราย รักษาอยู่ในหมู่บ้าน อาการป่วยครั้งนี้พบว่าประกอบด้วย ปวดกล้ามเนื้อ 34 ราย (100 %) ไข้ 34 ราย (100 %) มือ, แขน, ขาบวมทั้ง 2 ข้าง 9 ราย (26 %) อุดจากระวัง 7 ราย (21 %) อ่อนเพลีย 14 ราย (41 %) และปวดศีรษะ 12 ราย (35 %) การตัดชิ้นกล้ามเนื้อจากน่องผู้ป่วยหนึ่งรายส่งตรวจพบตัวอ่อนพยาธิทริคิโนสิสยืนยันว่าเป็นการระบาดของโรคนี้จริง ผู้ป่วยทุกรายมีประวัติรับประทานเนื้อหมูซึ่งถูกฆ่าและในวันที่ 14 เมษายนในหมู่บ้าน หมูดังกล่าวซื้อต่อมาจากชาวเขานำมาเลี้ยงไว้ระยะหนึ่งจึงได้นำมาฆ่าและ ส่วนใหญ่ได้นำมาประกอบอาหารลาบ ลู่ หรือแหมนรับประทานพร้อม ๆ กับการสอบสวนโรค ได้ให้การรักษาดูตามอาการแก่ผู้ที่ยังมีอาการป่วยอยู่ และได้ให้ความรู้ในเรื่องโรคทริคิโนสิสแก่ประชาชนในหมู่บ้าน แนะนำให้บริโภคเฉพาะเนื้อที่ปรุงสุกแล้ว ไม่ควรรับประทานดิบ ๆ สุก ๆ

ผู้รายงาน เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่