

รายงานการสอบสวนโรค

รายงานการสอบสวนผู้ติดเชื้อ HIV

โรงพยาบาลแม่และเด็กเมืองพล จังหวัดขอนแก่น มิถุนายน 2534

รายงานสอบสวนผู้ติดเชื้อ HIV รายที่ 1

ประวัติทั่วไป : ผู้ติดเชื้อชายไทย อายุ 25 ปี แต่งงานแล้ว อาชีพรับจ้าง ที่อยู่
จังหวัดขอนแก่น มาบริจาคโลหิต ที่โรงพยาบาลแม่และเด็กเมืองพล เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2533
ประวัติการเจ็บป่วย : ยังไม่มี
พฤติกรรมเสี่ยง : มีประวัติเที่ยวหญิงบริการ ในช่วงที่ทำงานรับจ้างที่กรุงเทพฯ
สรุป : ผู้ติดเชื้อรายนี้ติดเชื้อ HIV เนื่องจากมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการ
ผลการตรวจเลือดพบการติดเชื้อ HIV ทั้งวิธีเบื้องต้นและยืนยัน ขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่

รายงานสอบสวนผู้ติดเชื้อ HIV รายที่ 2

ประวัติทั่วไป : ผู้ติดเชื้อหญิงไทย อายุ 20 ปี แต่งงานแล้ว อาชีพแม่บ้าน ที่อยู่
จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้มารับบริการฝากครรภ์ ที่โรงพยาบาลแม่และเด็กเมืองพล เมื่อวันที่ 17
ธันวาคม 2533
ประวัติการเจ็บป่วย : ยังไม่มี
พฤติกรรมเสี่ยง : ติดเชื้อจากสามี ซึ่งมีประวัติเที่ยวหญิงบริการ
สรุป : ผู้ติดเชื้อรายนี้ ติดเชื้อ HIV เนื่องจากมีเพศสัมพันธ์กับสามี ซึ่งมี
ประวัติเที่ยวหญิงบริการ ผลการตรวจเลือด พบการติดเชื้อ HIV ทั้งวิธีเบื้องต้นและยืนยัน
ขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่

รายงานสอบสวนผู้ติดเชื้อ HIV รายที่ 3

ประวัติทั่วไป : ผู้ติดเชื้อชายไทย อายุ 25 ปี แต่งงานแล้ว อาชีพรับจ้าง ที่อยู่
จังหวัดขอนแก่น
ประวัติการเจ็บป่วย : ยังไม่มี
พฤติกรรมเสี่ยง : มีประวัติเที่ยวหญิงบริการในช่วงที่ทำงานรับจ้างที่กรุงเทพฯ
สรุป : ผู้ติดเชื้อรายนี้ติดเชื้อ HIV เนื่องจากมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการ
ผลการตรวจเลือดพบการติดเชื้อ HIV ทั้งวิธีเบื้องต้นและยืนยัน ขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่

รายงานการสอบสวนผู้ติดเชื้อ HIV

โรงพยาบาลแม่และเด็กเมืองพล จังหวัดขอนแก่น มิถุนายน 2534

(ต่อจากหน้า 310)

รายงานสอบสวนผู้ติดเชื้อ HIV รายที่ 4

ประวัติทั่วไป : ผู้ติดเชื้อเป็นหญิงไทย อายุ 17 ปี แต่งงานแล้ว อาชีพรับจ้าง
ที่อยู่จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการเจ็บป่วย : 27 ธันวาคม 2533 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่และเด็ก
เมืองพล เนื่องจากเป็นโรคหูดหงอนไก่ ผลการตรวจเลือด พบการติดเชื้อ HIV ทั้งวิธีเบื้องต้น
และยืนยัน ขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่

พฤติกรรมเสี่ยง : เคยเป็นหญิงอาชีพพิเศษ ติดเชื้อจากการประกอบอาชีพขาย
บริการทางเพศและเคยถูกข่มขืน 2 ครั้ง

สรุป : ผู้ติดเชื้อรายนี้ติดเชื้อ HIV เนื่องจากมีเพศสัมพันธ์ซึ่งกันเอง
มาจากการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ ผลการตรวจเลือด พบการติดเชื้อ HIV ทั้งวิธี
เบื้องต้นและยืนยัน ขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่

รายงานสอบสวนผู้ติดเชื้อ HIV รายที่ 5

ประวัติทั่วไป : ผู้ติดเชื้อชายไทย อายุ 23 ปี แต่งงานแล้ว อาชีพรับจ้าง ที่อยู่
จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการเจ็บป่วย : ยังไม่มี

พฤติกรรมเสี่ยง : แต่งงานกับหญิงที่ติดเชื้อ HIV ปฏิเสธไม่เคยใช้ยาเสพติดชนิดฉีด
เข้าเส้นและไม่เคยเที่ยวหญิงบริการ

สรุป : ผู้ติดเชื้อรายนี้ติดเชื้อ HIV เนื่องจากมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาที่
ติดเชื้อ HIV ผลการตรวจเลือด พบการติดเชื้อ HIV ทั้งวิธีเบื้องต้นและยืนยัน ขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่

รายงานสอบสวนผู้ติดเชื้อ HIV รายที่ 6

ประวัติทั่วไป : ผู้ติดเชื้อเป็นหญิงไทย อายุ 26 ปี แต่งงานแล้ว อาชีพแม่บ้าน
ที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้มารับบริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแม่และเด็กเมืองพล เมื่อวันที่ 15
มีนาคม 2534

ประวัติการเจ็บป่วย : ยังไม่มี พฤติกรรมเสี่ยง : ติดเชื้อจากสามีซึ่งมีประวัติเที่ยวหญิง
บริการ

สรุป : ผู้ติดเชื้อรายนี้ ติดเชื้อ HIV เนื่องจากมีเพศสัมพันธ์กับสามีซึ่งมี
ประวัติเที่ยวหญิงบริการ ผลการตรวจเลือด พบการติดเชื้อ HIV ทั้งวิธีเบื้องต้นและยืนยัน
ขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่

รายงานสอบสวนผู้ติดเชื้อ HIV รายที่ 7

ประวัติทั่วไป : ผู้ติดเชื้อชายไทย อายุ 24 ปี แต่งงานแล้ว อาชีพรับจ้าง ที่อยู่
จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติการเจ็บป่วย : ยังไม่มี

พฤติกรรมเสี่ยง : มีประวัติเที่ยวหญิงบริการในช่วงที่ทำงานรับจ้างที่กรุงเทพฯ

สรุป : ผู้ติดเชื้อรายนี้ ติดเชื้อ HIV เนื่องจากมีเพศสัมพันธ์กับหญิง
บริการ ผลการตรวจเลือด พบการติดเชื้อ HIV ทั้งวิธีเบื้องต้นและยืนยัน ขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่

รายงานสอบสวนผู้ติดเชื้อ HIV รายที่ 8

ประวัติทั่วไป : ผู้ติดเชื้อเป็นหญิงไทย อายุ 20 ปี แต่งงานแล้ว อาชีพแม่บ้าน
ที่อยู่จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้มารับบริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแม่และเด็กเมืองพล เมื่อวันที่
5 เมษายน 2534

ประวัติการเจ็บป่วย : ยังไม่มี

พฤติกรรมเสี่ยง : ติดเชื้อจากสามี ซึ่งมีประวัติเที่ยวหญิงบริการ

สรุป : ผู้ติดเชื้อรายนี้ ติดเชื้อ HIV เนื่องจากมีเพศสัมพันธ์กับสามี ซึ่งมี
ประวัติเที่ยวหญิงบริการ ผลการตรวจเลือด พบการติดเชื้อ HIV ทั้งวิธีเบื้องต้นและยืนยัน
ขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่

รายงานสอบสวนผู้ติดเชื้อ HIV รายที่ 9

ประวัติทั่วไป : ผู้ติดเชื้อชายไทย อายุ 22 ปี แต่งงานแล้ว อาชีพรับจ้าง ที่อยู่
จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการเจ็บป่วย : เคยเป็นโรค Herpes zoster รักษาหายแล้ว

พฤติกรรมเสี่ยง : ไปทำงานกรุงเทพฯ เมื่อปลายปี 2533 แล้วไปเที่ยวหญิงบริการ

สรุป : ผู้ติดเชื้อรายนี้ ติดเชื้อ HIV เนื่องจากมีเพศสัมพันธ์กับหญิง
บริการ ผลการตรวจเลือด พบการติดเชื้อ HIV ทั้งวิธีเบื้องต้นและยืนยัน ขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่

รายงานโดย นายสมพร กุศลเลิศจริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่และเด็กเมืองพล

บทบรรณาธิการ

โรงพยาบาลแม่และเด็กเมืองพลได้รายงานผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ไม่มีอาการ จำนวน 9 ราย เป็นผู้ติดเชื้อชาย 5 ราย ผู้ติดเชื้อหญิง 4 ราย ทั้งหมดมีปัจจัยเสี่ยงจากการร่วมเพศแบบรักต่างเพศ ผู้ติดเชื้อชาย 4 ราย มีภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อจากการเที่ยวหญิงบริการในกรุงเทพฯ ผู้ติดเชื้อชายอีก 1 ราย แต่งงานกับหญิงที่ติดเชื้อเอดส์มาก่อน ผู้ติดเชื้อหญิง 3 ราย ติดจากสามีซึ่งติดเชื้อเอดส์มาจากการเที่ยวหญิงบริการอีกทอดหนึ่ง รายงานฉบับนี้ เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ ซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง และลุกลามเข้าสู่ผู้หญิงทั่วไปแล้ว จากข้อมูลการเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อ HIV เฉพาะพื้นที่ ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เคยเป็นภาคที่อัตราการตายของการติดเชื้อเอดส์ต่ำสุดในการสำรวจช่วงปี พ.ศ. 2532 และกลางปี พ.ศ. 2533 แต่การสำรวจในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2533 อัตราการติดเชื้อมีแนวโน้มสูงขึ้นมากด้วยอัตราที่สูงกว่าภาคอื่นๆ คือเพิ่มขึ้นจาก 0.10% ในเดือนมิถุนายน 2533 เป็น 0.69% ในเดือนธันวาคม 2533 (เพิ่มประมาณ 6.7 เท่า) ในขณะที่ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศเพิ่มจาก 0.21% เป็น 0.73% (เพิ่มประมาณ 3-4 เท่า) ในช่วงเวลาเดียวกัน⁽¹⁾ เหตุผลที่เป็นไปได้ประการหนึ่งคือ การที่ชายหนุ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางไปทำงานในที่ต่างๆ และเที่ยวหญิงบริการ ในที่สุดก็เดินทางกลับภูมิลำเนา ส่วนหนึ่งก็ติดเชื้อเอดส์กลับไป และเมื่อแต่งงานหรือมีเพศสัมพันธ์กับหญิงทั่วไปก็ได้แพร่เชื้อเอดส์ให้ฝ่ายหญิงต่อไป เหตุการณ์ทำนองนี้น่าจะเกิดขึ้นทั่วไป ไม่เฉพาะประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น

ปัจจุบันได้มีการรณรงค์การป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มหญิงบริการ และชายนักเที่ยวกันอย่างกว้างขวาง เช่น การรณรงค์ให้ใช้ถุงยางอนามัย การให้สุศึกษา การรณรงค์ผ่านทางสื่อมวลชน เป็นต้น อย่างไรก็ตามโครงการป้องกันที่จำเพาะสำหรับหญิงทั่วไปที่อาจจะติดเชื้อจากชายนักเที่ยวยังมีการพูดถึงกันน้อย น่าจะได้มีการพัฒนาโครงการเหล่านี้ต่อไป เช่น การให้คำปรึกษาก่อนสมรส การตรวจเลือดก่อนสมรส การให้ข้อมูลต่อประชาชนถึงอัตราการติดเชื้อเอดส์ในชายทั่วไป และอื่นๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดผลในการป้องกันเชื้อเอดส์สู่หญิงทั่วไป เพราะถ้าหากไม่สามารถสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์สู่หญิงทั่วไปได้แล้ว จะไม่สามารถป้องกันการทารกจำนวนมากที่จะป่วยและเสียชีวิตจากโรคเอดส์ และทารกที่จะกำพร้าเพราะบิดามารดาป่วยเป็นเอดส์และเสียชีวิต ในช่วงเวลา 5-10 ปีข้างหน้าได้เลย

บทบรรณาธิการโดย คณะทำงานติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา

เอกสารอ้างอิง

1. กองระบาดวิทยา รายงานผลการเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อ HIV เฉพาะพื้นที่ ครั้งที่ 4 ธันวาคม 2533 (ข้อมูลยังไม่ตีพิมพ์)

#####