



ปีที่ 51 ฉบับที่ 25 : 3 กรกฎาคม 2563

Volume 51 Number 25: July 3, 2020

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / Division of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health



รายงานสถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม-15 มิถุนายน 2563
Situation of Coronavirus disease 2019 (COVID-19) deaths, Thailand,
3 January-15 June 2020

✉ chailek.ch@gmail.com

ชนาธิป ไชยเหล็ก¹, กันทิลา ทวีวิทยการ¹, นิรันดร์ ยิ้มจอหอ¹,นิภาพรณ สฤทธอภิกฤษ¹, เฉวตสร นามวา¹, นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ²¹กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, ²กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

สถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ในประเทศไทยระหว่าง มกราคม-มิถุนายน 2563 ซึ่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานการสอบสวนโรค และเวชระเบียนของโรงพยาบาล ด้วยแบบสอบสวนผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห์ ผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วงวันที่ 3 มกราคม-15 มิถุนายน 2563 รวม 58 ราย จากผู้ติดเชื้อทั้งหมด 3,236 ราย อัตราป่วยตายโดยรวมของประเทศไทยเท่ากับ 1.85 เมื่อแยกแยะระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล กับต่างจังหวัดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 44 ราย (ร้อยละ 75.9) ค่ามัธยฐานของอายุเท่ากับ 58 ปี (IQR 50-70) โดยอัตราป่วยตายเพิ่มขึ้นตามกลุ่มอายุที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว ได้แก่ ภาวะอ้วน (BMI ≥ 30 กก./ตร.ม.) ร้อยละ 24.1 (14 ราย) สัดส่วนของโรคเบาหวานและภาวะอ้วนในกลุ่มอายุน้อยกว่า 60 ปี มีแนวโน้มมากกว่าในกลุ่มผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อาการ

ของผู้ป่วยที่พบ คือ ไข้ ไอ และเจ็บคอ (ร้อยละ 98.3, 86.2 และ 86.2 ตามลำดับ) ค่ามัธยฐานของอุณหภูมิร่างกายแปรผันเท่ากับ 37.8 องศาเซลเซียส (IQR 37.0-38.8)

ตารางที่ 1 ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันแรกของการนอนโรงพยาบาล ช่วงวันที่ 3 มกราคม-15 มิถุนายน 2563 (N=58)

อาการ	จำนวน (ร้อยละ)
ไข้	57 (98.3)
ไอ	50 (86.2)
เจ็บคอ	50 (86.2)
หายใจเหนื่อย	42 (72.4)
เสมหะ	22 (37.9)
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	20 (34.5)
น้ำมูก	15 (25.9)
คลื่นไส้หรืออาเจียน	10 (17.2)
อุจจาระร่วง	10 (17.2)
อ่อนเพลีย	9 (15.5)
ปวดศีรษะ	8 (13.8)



◆ รายงานสถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม-15 มิถุนายน 2563	369
◆ สรุปการตรวจข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 25 ระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2563	371
◆ ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 25 ระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2563	375

คณะที่ปรึกษา

นายแพทย์สุชาติ เจตนเสน นายแพทย์ประยูร ภูนาศ
นายแพทย์ดำนวน อึ้งชูศักดิ์ นายสัตวแพทย์ประวิทย์ ชุมเกษียร
องอาจ เจริญสุข

หัวหน้ากองบรรณาธิการ : แพทย์หญิงจวลัยรัตน์ ไชยฟู

บรรณาธิการวิชาการ : แพทย์หญิงกนกทิลา ทวีวิทยาการ


กองบรรณาธิการ

คณะทำงานด้านบรรณาธิการ กองระบาดวิทยา

ฝ่ายข้อมูล

สมาน สุขุมภูจินันท์ ศศิธรณ์ มาแเคียน
พัชรี ศรีหมอก

เมื่อพิจารณาวันที่เริ่มมีอาการจนถึงวันที่มารับการรักษา ผู้เสียชีวิตได้รับการวินิจฉัยในวันที่ 7 (IQR 5-9) ยาพาวิพราเวียร์ในวันที่ 9 (IQR 7-11) การใส่ท่อช่วยหายใจในวันที่ 10 (IQR 7-15) และเสียชีวิตในวันที่ 18 (IQR 14-25) สรุปลักษณะผู้ป่วยตายระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับต่างจังหวัดไม่มีความแตกต่างกัน ในผู้เสียชีวิตอายุน้อยกว่า 60 ปี พบสัดส่วนของโรคเบาหวานและภาวะอ้วนมากกว่าผู้สูงอายุ แพทย์ผู้รักษาจึงควรดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิด



รูปที่ 1 ผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำแนกตามวันที่เสียชีวิต ช่วงวันที่ 3 มกราคม–15 มิถุนายน 2563 ประเทศไทย (N=58)

แนะนำการอ้างอิงสำหรับบทความนี้

ชนาธิป ไชยเหล็ก, กนกทิลา ทวีวิทยาการ, นิรันดร์ ยิ้มจอหอ, นิภาพรณ สฤทธอภีรักษ์, เฉตสร นามวาท, นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ. รายงานสถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม–15 มิถุนายน 2563. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์. 2563; 51: 369–70.

Suggested Citation for this Article

Chailek C, Taweewigyakarn P, Yimchoho N, Saritapirak N, Namwat C, Sawanpanyalert N. Situation of Coronavirus disease 2019 (COVID-19) deaths, Thailand, 3 January–15 June 2020. Weekly Epidemiological Surveillance Report. 2020; 51: 369-70.